



# มาตรการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อลดอุบัติการณ์ในช่วงนี้

1. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคปากและเท้าเปื่อย ได้แก่

- 1.1. พื้นที่ 5 กิโลเมตร รอบตลาดนัดค้าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ แหล่งรวมสัตว์
- 1.2. พื้นที่ 5 กิโลเมตร รอบสถานที่เลี้ยงโคนม (รวมโคนม)
- 1.3. พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ใน 3 ปีที่มา
- 1.4. สถานที่อื่นๆ

โดยมีแนวทางการฉีดวัคซีน คือ พื้นที่ทั่วไปฉีดวัคซีน O โมโนวาเลนท์ และกระตุ้นวัคซีนไบวาเลนท์ หรือ 2 โทป์ (O A) ภายหลังจากฉีดวัคซีน O โมโนวาเลนท์ 14 วัน

โดยอาจพิจารณาเปลี่ยนลำดับการฉีดวัคซีนดังกล่าวตามความเหมาะสมในพื้นที่ ซึ่งกำหนดการดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

2. ชะลอการเคลื่อนย้ายโค กระบือ แพะ แกะ ในจังหวัดที่มีการระบาดของโรคหลายแห่ง ระยะเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อลดการแพร่กระจายโรค
3. เชิญศูนย์รับนม สหกรณ์โคนมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรค

ตลอดจนประชาสัมพันธ์เตือนภัย การป้องกันควบคุมโรค

4. รณรงค์ทำลายเชื้อโรคที่จุดเสี่ยง เช่นตลาดนัดค้าสัตว์ คอกกักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และร่วมทำลายเชื้อโรคที่ศูนย์รับนม สหกรณ์โคนม
5. ประสานฝ่ายปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาสัตว์ป่วย และร่วมควบคุมโรค
6. จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการควบคุมโรคทันทีที่ได้รับแจ้งการเกิดโรค
7. ฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัสที่ระบาดในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจการเลือกใช้ seed วัคซีน
8. ติดตามความคืบหน้าของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย
9. การแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน โดยพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของวัคซีนให้ดียิ่งขึ้นและส่งเสริมการป้องกันโรคเข้าฟาร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานฟาร์ม

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

1 ธันวาคม 2559